



Nombre total de cas confirmés (par semaine, 2015)



RESUME

- Aucun cas confirmé de maladie à virus Ebola n'a été notifié au cours de la semaine précédant le 27 décembre. Le 29 décembre, l'OMS a déclaré la fin de la transmission interhumaine du virus Ebola en Guinée, après une période de 42 jours sans nouveau cas depuis que la dernière personne confirmée positive au virus Ebola a obtenu un second résultat négatif consécutif pour la recherche d'ARN du virus Ebola dans un échantillon de sang. La Guinée a désormais entamé une période de 90 jours de vigilance renforcée.
- La transmission interhumaine liée au dernier foyer de cas au Libéria sera déclarée terminée le 14 janvier 2016, 42 jours après le second résultat négatif consécutif au test de dépistage d'Ebola des deux derniers cas, si aucun autre cas n'est notifié. En Sierra Leone, la transmission interhumaine liée au foyer primaire de maladie à virus Ebola a été déclarée terminée le 7 novembre 2015. Le pays est entré dans une phase de 90 jours de surveillance soutenue prévue pour durer jusqu'au 5 février 2016.
- La huitième réunion du Comité d'urgence convoquée par le Directeur général de l'OMS en vertu du Règlement sanitaire international (2005) portant sur l'épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a eu lieu par téléconférence le 15 décembre 2015. Suivant l'avis du Comité, le Directeur général a déclaré que l'épidémie d'Ebola 2014-2015 continue d'être une urgence de santé publique de portée internationale.
- Le dernier foyer de cas au Libéria résultait de la réémergence du virus Ebola qui avait persisté chez une personne précédemment infectée. Bien que la probabilité de ces événements de réémergence soit faible, le risque d'une transmission ultérieure à la suite d'une réémergence souligne l'importance de mettre en œuvre un ensemble complet de services pour les survivants, comprenant l'analyse de liquides biologiques adéquats pour rechercher l'ARN du virus Ebola. Les gouvernements du Libéria et de la Sierra Leone, avec le soutien de partenaires tels que l'OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, ont mis en place un dépistage volontaire sur échantillons de sperme et des programmes de conseil auprès des hommes ayant survécu à Ebola, afin d'aider les personnes concernées à comprendre les risques qu'ils encourent et à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs proches contacts. Au 27 décembre, au Libéria et en Sierra Leone, 405 hommes survivants avaient bénéficié de services de dépistage sur échantillons de sperme. Un réseau de services cliniques pour les survivants est également déployé au Libéria et en Sierra Leone, et des politiques nationales globales pour la prise en charge des survivants à Ebola devraient être finalisées en janvier 2016.
- Afin de gérer efficacement les conséquences des risques résiduels d'Ebola et y riposter, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont tous mis en place des systèmes de surveillance permettant aux agents de santé et au public de signaler aux autorités compétentes les cas de maladie ou les décès possiblement liés à Ebola. Dans la semaine précédant le 27 décembre, 933 alertes de décès communautaires ont été enregistrées en Guinée en provenance des 34 préfectures du pays. Au cours de cette période, neuf laboratoires opérationnels en Guinée ont analysé au total 541 échantillons nouveaux et répétés (six prélevés sur des patients en vie et 535 sur des personnes décédées) provenant de seulement 14 des 34 préfectures guinéennes. Au Libéria, 611 alertes ont

été reçues en provenance des 15 comtés du pays. Au cours de cette période, les cinq laboratoires opérationnels en Guinée ont testé 469 échantillons nouveaux et répétés (281 prélevés sur des patients en vie et 188 sur des personnes décédées) pour le virus Ebola. En Sierra Leone, 1226 alertes ont été enregistrées la semaine précédant le 20 décembre (la dernière semaine pour laquelle les données sont disponibles). Entre le 21 et le 27 décembre, les huit laboratoires opérationnels en Sierra Leone ont testé 734 échantillons nouveaux et répétés (10 prélevés sur des patients en vie et 724 sur des personnes décédées) pour le virus Ebola.

- Le déploiement d'équipes d'intervention rapide lorsqu'un nouveau cas est confirmé reste la pierre angulaire de la stratégie de riposte nationale en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Chaque pays dispose d'au moins une équipe nationale d'intervention rapide, et bénéficie du renforcement des moyens nationaux et infranationaux d'intervention rapide et de la validation des plans d'action en cas d'incident qui se poursuivent en décembre et en janvier.

Figure 1 : Cas confirmés, probables et suspects de maladie à virus Ebola dans le monde (données au 27 décembre 2015)




Tableau 1 : Cas confirmés, probables et suspects en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone

Pays	Définition des cas	Cas cumulés	Cas au cours des 21 derniers jours	Décès cumulés
Guinée [#]	Confirmés	3 351	0	2 083
	Probables	453	*	453
	Suspects	0	*	‡
	Total	3 804	0	2 536
Libéria**	Confirmés	3 151	-	‡
	Probables	1 879	-	‡
	Suspects	5 636	-	‡
	Total	10 666	-	4 806
	Confirmés	9	0	3
	Probables	*	*	‡
	Suspects	‡	*	‡
	Total	9	0	3
Sierra Leone [§]	Confirmés	8 704	0	3 589
	Probables	287	*	208
	Suspects	5 131	*	158
	Total	14 122	0	3 955
Total	Confirmés	15 215	0	‡
	Probables	2 619	*	‡
	Suspects	10 767	*	‡
	Total	28 601	0	11 300

Les données reposent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé. Ces chiffres peuvent être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de laboratoire. * Données non présentées en raison de la proportion importante de cas probables ou suspects qui ont été reclassés. ‡ Données non disponibles. ** Les cas notifiés avant le 9 mai 2015 figurent sur fond bleu. Ces totaux sont sujets à révision en raison de la surveillance en cours et de la validation rétrospective des cas et des décès. § Le 7 novembre 2015, la Sierra Leone a été déclarée exempte de transmission du virus Ebola dans la population humaine, et le pays a entamé une période 90 jours de surveillance renforcée. # Le 29 décembre 2015, la Guinée a été déclarée exempte de transmission du virus Ebola dans la population humaine, et le pays est désormais entré dans une période 90 jours de surveillance renforcée.

CADRE D'ACTION DE LA PHASE 3

- Au total, 28 601 cas confirmés, probables et suspects ont été notifiés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, dont 11 300 décès (Tableau 1 ; Figure 2) depuis le début de l'épidémie d'Ebola. La majorité de ces cas et de ces décès ont été notifiés entre août et décembre 2014 ; l'incidence des cas a ensuite commencé à diminuer grâce à l'intensification rapide des capacités de traitement, d'isolement et d'inhumation sûre dans les trois pays. Cette opération d'intensification rapide correspond à la phase 1 de la riposte. Elle a été suivie, au premier semestre 2015, d'une période d'amélioration continue de la surveillance, de la recherche des contacts et des interventions en faveur de la participation communautaire. Cette période, appelée phase 2, a permis de réduire l'incidence des cas à 5 cas maximum par semaine à partir de la fin juillet. Cette diminution importante de l'incidence des cas a marqué une transition vers une troisième phase distincte de l'épidémie, qui se caractérise par une transmission limitée, touchant des zones géographiques restreintes, combinée à une faible probabilité d'incidents susceptibles d'avoir de graves conséquences conduisant à la réémergence de la maladie à virus Ebola à partir de réservoirs où le virus persiste encore. Pour rompre efficacement les chaînes de transmission restantes et pour gérer les risques résiduels dus à la persistance du virus, l'OMS, en tant qu'institution chef de file au sein de la Collaboration interinstitutions contre Ebola, et en coordination avec les partenaires nationaux et internationaux, a élaboré le cadre d'action de la phase 3 de la lutte

anti-Ebola. Ce cadre s'appuie sur les phases 1 et 2 pour incorporer de nouveaux éléments de la lutte contre Ebola, allant des vaccins et des équipes d'intervention rapide aux services de conseil et de bien-être pour les survivants. Les indicateurs présentés ci-après illustrent dans le détail les progrès accomplis pour atteindre les deux objectifs principaux du cadre d'action de la phase 3.

OBJECTIF 1 : ROMPRE RAPIDEMENT TOUTES LES CHAINES DE TRANSMISSION D'EBOLA RESTANTES

- La transmission interhumaine liée au dernier foyer de cas au Libéria sera déclarée terminée le 14 janvier 2016, 42 jours après le second résultat négatif consécutif au test de dépistage d'Ebola des deux derniers cas, si aucun autre cas n'est notifié. La transmission interhumaine liée au foyer primaire de maladie à virus Ebola en Guinée a été déclarée terminée le 29 décembre 2015, 42 jours après le second résultat négatif consécutif pour la recherche d'ARN du virus Ebola dans un échantillon de sang du dernier cas dans le pays, notifié le 29 octobre. Le pays a désormais entamé une période de 90 jours de vigilance renforcée. En Sierra Leone, la transmission interhumaine liée au foyer primaire de maladie à virus Ebola a été déclarée terminée le 7 novembre 2015. Le pays est entré dans une phase de 90 jours de surveillance soutenue prévue pour durer jusqu'au 5 février 2016.
- Les investigations visant à déterminer l'origine de l'infection du foyer des 3 cas confirmés d'Ebola au Libéria la semaine précédant le 22 novembre ont révélé que ce foyer résultait d'une réémergence rare du virus qui a persisté chez un survivant. Le premier cas notifié dans ce foyer était un garçon âgé de 15 ans dont le test de dépistage d'Ebola s'est révélé positif après son admission dans un établissement de santé du Grand Monrovia le 19 novembre. Il a ensuite été transféré vers un centre de traitement Ebola avec les cinq autres membres de sa famille. Deux de ces membres – son frère âgé de 8 ans et son père âgé de 40 ans – ont été dépistés positifs à Ebola par la suite alors qu'ils étaient placés en isolement. Tous deux ont obtenu deux résultats négatifs au test de dépistage d'Ebola le 3 décembre. Le garçon de 15 ans est décédé le 23 novembre.

Tableau 2 : Cas et contacts par préfecture/comté au cours des trois dernières semaines

Pays	Préfecture/comté	Semaine		21	22	23	24	25	26	27	Semaine 52	Contacts suivis*
		50	51	déc.	déc.	déc.	déc.	déc.	déc.			
Guinée	Forécariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Libéria	Montserrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les données reposent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé. Ces chiffres peuvent être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de laboratoire. * Données au 27 décembre 2015.

Tableau 3 : Localisation et épidémiologie des cas confirmés notifiés au cours des trois semaines précédant le 27 décembre 2015

Pays	Préfecture/comté	Sous-préfecture/district	Semaine 50 (du 7 au 13 déc. 2015)	Semaine 51 (du 14 au 20 déc. 2015)	Cas	Semaine 52 (du 21 au 27 décembre 2015)				Date du dernier cas confirmé
						Cas figurant dans la liste des contacts	Lien épidémiologiques*	Source d'infection inconnue [†]	Décès communautaires confirmés [‡]	
Guinée	Forécariah	Kaliah	0	0						29/10/2015
Sous-total			0	0	0	0	0	0	0	
Libéria	Montserrado	Grand Monrovia	0	0						20/11/2015
Sous-total			0	0	0	0	0	0	0	
Total			0	0	0	0	0	0	0	


* Le lien épidémiologique fait référence aux cas non répertoriés comme des contacts d'un précédent cas (refus de coopérer ou suivi impossible), mais qui s'avèrent avoir été en contact avec un cas connu après investigation épidémiologique approfondie, OU aux cas membres/issus d'une communauté touchée par une transmission active au cours des 21 derniers jours. [†] Includ les cas faisant l'objet d'une investigation épidémiologique. [‡] Un cas appartenant à la catégorie des décès communautaires peut aussi être répertorié comme un contact, ou comme ayant été en contact avec un cas connu après investigation (lien épidémiologique), ou encore comme n'ayant aucun lien avec un cas précédent.

Tableau 4 : Principaux indicateurs de performance pour l'objectif 1 de la phase 3 en Guinée

Indicateur	Semaine 43	Semaine 52	Cible
Nombre de cas confirmés	<p>A bar chart with a vertical axis from 0 to 4. The first bar (week 43) has a height of 3. The second bar (week 52) has a height of 1.</p>	0	0
Nombre de décès confirmés (total en bleu clair) et proportion de décès survenus dans la communauté (bleu foncé)	<p>A bar chart with a vertical axis from 0 to 4. There is one bar with a height of 1.</p>	0	0
Pourcentage de nouveaux cas parmi les contacts recensés	<p>A line chart with a vertical axis from 0% to 100%. Two data points are plotted at 100% for week 43 and week 52, connected by a horizontal line.</p>	N/A	100%

Les principaux indicateurs de performance sont définis à l'annexe 1. La semaine 43 a commencé le 19 octobre. La semaine 52 s'est achevée le 27 décembre 2015.


Figure 2 : Répartition géographique des nouveaux cas et de l'ensemble des cas confirmés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone



Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

RAPPORT DE SITUATION SUR LA FLAMBÉE DE MALADIE À VIRUS EBOLA

Figure 3 : Cas confirmés de maladie à virus Ebola notifiés chaque semaine aux niveaux national et préfectoral en Guinée



OBJECTIF 2 : GERER LES CONSEQUENCES DES RISQUES RESIDUELS D'EBOLA ET Y RIPOSTER


- Les principaux indicateurs de performance pour l'objectif 2 du cadre d'action de la phase 3 pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont illustrés dans le Tableau 5. Une liste complète des indicateurs de la phase 3 de la riposte est présentée en annexe 2.
- On sait maintenant que le dernier foyer de cas au Libéria résulte de la réémergence du virus Ebola qui avait persisté chez une personne précédemment infectée. Bien que la probabilité de ces événements de réémergence soit faible, le risque d'une transmission ultérieure à la suite d'un incident de réémergence souligne l'importance de mettre en œuvre un ensemble complet de services pour les survivants, comprenant l'analyse de liquides biologiques adéquats pour rechercher l'ARN du virus Ebola. Les gouvernements du Libéria et de la Sierra Leone, avec le soutien de partenaires tels que l'OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, ont mis en place un dépistage volontaire sur échantillons de sperme et des programmes de conseil auprès des hommes ayant survécu à Ebola, afin d'aider les personnes concernées à comprendre les risques qu'ils encourent et à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs proches contacts. Un réseau de services cliniques pour les survivants est également déployé au Libéria et en Sierra Leone, et des politiques nationales globales pour la prise en charge des survivants à Ebola devraient être finalisées en janvier 2016. Ces initiatives sont également prévues en Guinée, mais sont actuellement à un stade moins avancé.
- Afin de gérer les conséquences des risques résiduels d'Ebola et y riposter, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont tous mis en place des systèmes de surveillance permettant aux agents de santé et au public de signaler aux autorités compétentes les cas de maladie fébrile ou les décès possiblement liés à Ebola. Dans la semaine précédant le 27 décembre, 933 alertes de décès communautaires ont été enregistrées en Guinée en provenance des 34 préfectures du pays. Au Libéria, 611 alertes ont été reçues en provenance des 15 comtés du pays au cours de cette période. En Sierra Leone, 1226 alertes ont été enregistrées la semaine précédant le 20 décembre (la dernière semaine pour laquelle les données sont disponibles).
- Dans le cadre de la stratégie de surveillance d'Ebola dans chaque pays, des échantillons sanguins et des écouvillons oraux doivent être prélevés chez toute personne vivante ou décédée qui présente ou qui a présenté des symptômes évocateurs de la maladie à virus Ebola. Entre le 21 et le 27 décembre, neuf laboratoires opérationnels en Guinée ont analysé au total 541 échantillons nouveaux et répétés provenant de seulement 14 des 34 préfectures guinéennes. La tendance du nombre d'échantillons testés chaque semaine reste stable depuis deux mois. Au total, 99 % des échantillons testés en Guinée étaient des écouvillons prélevés sur des personnes décédées. Inversement, 60 % des 469 échantillons nouveaux et répétés testés au Libéria sur cette même période étaient des échantillons sanguins prélevés sur des patients en vie. En outre, 14 des 15 comtés du Libéria ont envoyé des échantillons dans les cinq laboratoires d'analyses opérationnels dans le pays. En Sierra Leone, 734 échantillons nouveaux et répétés provenant des 14 districts sierra-léonais ont été recueillis et testés dans huit laboratoires opérationnels. Au total, 99 % des échantillons testés en Sierra Leone étaient des écouvillons prélevés sur des personnes décédées (Tableau 5, Figures 4 et 5).
- Dans la semaine précédant le 27 décembre, 933 décès communautaires ont été enregistrés en Guinée par l'intermédiaire du système d'alerte national (Tableau 5). Cela représente environ 42 % des 2248 décès attendus, calculés à partir des estimations de la population et du taux brut annuel de mortalité qui s'élève à 11 décès pour 1000 personnes. Sur cette période, 110 décès communautaires ont été notifiés par le Libéria, ce qui représente environ 11 % des 982 décès communautaires attendus chaque semaine. La Sierra Leone a notifié 1039 décès communautaires la semaine précédant le 20 décembre, ce qui représente environ 50 % des 2075 décès communautaires attendus par semaine.
- Le déploiement d'équipes d'intervention rapide lorsqu'un nouveau cas est confirmé reste la pierre angulaire de la stratégie de riposte nationale en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Chaque pays dispose d'au moins une équipe nationale d'intervention rapide, et bénéficie du renforcement des moyens nationaux et infranationaux d'intervention rapide et de la validation des plans d'action en cas d'incident qui se poursuivent en décembre 2015 et en janvier 2016.

Tableau 5 : Principaux indicateurs de performance pour l'objectif 2 de la phase 3 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone dans la semaine précédant le 27 décembre

Indicateur	Guinée	Libéria	Sierra Leone
Objectif 2 : Prévenir/Les survivants			
Nombre de survivants recensés (bleu foncé) et nombre estimé de survivants (bleu clair)	1268*	1550 [§]	4051* 3032
Nombre et pourcentage de survivants recensés ayant accès à l'ensemble des services essentiels	Données non encore compilées	20% 309	88% 2668
Nombre d'échantillons de sperme de survivants testés (bleu clair) et pourcentage de résultats positifs (bleu foncé)	Données non encore compilées	309 31	96**
Objectif 2 : Détecter/La surveillance			
Nombre d'alertes (personnes vivantes en bleu clair, décès communautaires en bleu foncé)	933	611	1226*
Nombre d'échantillons nouveaux et répétés testés (personnes vivantes en bleu clair, personnes décédées en bleu foncé) [#]	541	469	734
Pourcentage de préfecture/comtés/districts qui ont fourni des échantillons à tester	41%	93%	100%
Objectif 2 : Riposter/Les équipes d'intervention rapide			
Nombre d'équipes d'intervention rapide opérationnelles aux niveaux national et/ou infranational	3*	3	3
Nombre d'exercices de simulation d'ampleur nationale réalisés	0*	0	Exercices de simulation réalisés. Données non encore compilées.


Toutes les données sont fournies par les bureaux de pays de l'OMS. * Données qui ne proviennent pas de la semaine se terminant le 27 décembre 2015. [§] Le nombre estimé de survivants n'est pas encore confirmé. ** Le nombre d'échantillons positifs n'a pas encore été communiqué. Les principaux indicateurs de performance sont définis à l'annexe 1.

Figure 4 : Emplacement des laboratoires et répartition géographique des échantillons provenant de patients en vie en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone dans la semaine précédant le 27 décembre 2015




L'analyse englobe les échantillons initiaux et répétés, mais exclut les échantillons pour lesquels les dates d'analyse ou l'origine géographique ne sont pas connues ou sont incorrectes. EDPLN : Réseau de laboratoires travaillant sur les agents pathogènes émergents et dangereux. Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif. 1 = IP Dakar – Conakry ; 4 = laboratoire mobile K-Plan – Conakry ; 7 = laboratoire REDC – Conakry ; 10 = laboratoire mobile de l'UE – Coyah ; 12 = laboratoire mobile K-Plan – Forécariah ; 13 = laboratoire CREMS – Kindia ; 15 = laboratoire mobile de Boké ; 16 = laboratoire INSP/PFHG/IPD - N'Zérékoré ; 17 = laboratoire EUWAM – Conakry ; 19 = laboratoire de référence nationale LIBR/USAMRIID ; 20 = laboratoire mobile OIC-NMRC – Bong ; 21 = laboratoire de Tappita – Nimba ; 28 = laboratoire du Ministère de la santé – Montserrado ; 29 = laboratoire du Redemption Hospital – Montserrado ; 31 = EMDF/NICD – district urbain de la Zone de l'Ouest ; 32 = laboratoire du CDC de Chine – Jui ; 34 = laboratoire mobile PH England – Port Loko ; 35 = laboratoire mobile PH England – Makeni ; 37 = laboratoire mobile PH England – Kenema ; 38 = laboratoire mobile du Nigéria – Kambia ; 44 = CPHRL/DTRA – district urbain de la Zone de l'Ouest ; 46 = Ministère de la santé/Urgences – PCMH/Freetown.

Figure 5 : Emplacement des laboratoires et répartition géographique des échantillons provenant de patients décédés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone dans la semaine précédant le 27 décembre 2015



L'analyse englobe les échantillons initiaux et répétés, mais exclut les échantillons pour lesquels les dates d'analyse ou l'origine géographique ne sont pas connues ou sont incorrectes. EDPLN : Réseau de laboratoires travaillant sur les agents pathogènes émergents et dangereux. Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif. 1 = IP Dakar – Conakry ; 4 = laboratoire mobile K-Plan – Conakry ; 7 = laboratoire REDC – Conakry ; 10 = laboratoire mobile de l'UE – Coyah ; 12 = laboratoire mobile K-Plan – Forécariah ; 13 = laboratoire CREMS – Kindia ; 15 = laboratoire mobile de Boké ; 16 = laboratoire INSP/PFHG/IPD - N'Zérékoré ; 17 = laboratoire EUWAM – Conakry ; 19 = laboratoire de référence nationale LIBR/USAMRIID ; 20 = laboratoire mobile OIC-NMRC – Bong ; 21 = laboratoire de Tappita – Nimba ; 28 = laboratoire du Ministère de la santé – Montserrado ; 29 = laboratoire du Redemption Hospital – Montserrado ; 31 = EMDF/NICD – district urbain de la Zone de l'Ouest ; 32 = laboratoire du CDC de Chine – Jui ; 34 = laboratoire mobile PH England – Port Loko ; 35 = laboratoire mobile PH England – Makeni ; 37 = laboratoire mobile PH England – Kenema ; 38 = laboratoire mobile du Nigéria – Kambia ; 44 = CPHRL/DTRA – district urbain de la Zone de l'Ouest ; 46 = Ministère de la santé/Urgences – PCMH/Freetown.

Figure 6 : Délai écoulé depuis le dernier cas confirmé, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone



Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

PAYS PRECEDEMMENT TOUCHES

- Sept pays (Espagne, États-Unis d'Amérique, Italie, Mali, Nigéria, Royaume-Uni et Sénégal) ont précédemment notifié un ou plusieurs cas importés d'un pays où la transmission est étendue et intense.

PRÉPARATION DES PAYS À RAPIDEMENT DÉTECTER UNE EXPOSITION AU VIRUS EBOLA ET Y RIPOSTER

- Le risque d'introduction d'un cas de maladie à virus Ebola dans un pays non touché demeure tant que des cas existent dans un pays, quel qu'il soit. Cependant, grâce à une préparation adéquate, ce risque peut être limité moyennant une action rapide et efficace.
- Les activités de préparation menées par l'OMS visent à s'assurer que tous les pays sont prêts à effectuer une détection efficace et sans risque, à rechercher et notifier les cas potentiels de maladie à virus Ebola, et à mettre en place une riposte efficace. L'OMS apporte ce soutien à travers la visite d'équipes de renforcement de la préparation dans les pays pour aider à identifier et hiérarchiser les lacunes et les besoins, moyennant une assistance technique directe, et des conseils et outils techniques.

Pays prioritaires en Afrique

- Le soutien de l'OMS et de ses partenaires est d'abord centré sur les pays les plus fortement prioritaires — Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal –, puis sur les pays à priorité élevée – Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Gambie, Ghana, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Soudan du Sud et Togo. Les critères utilisés pour affecter une priorité aux pays comprennent la proximité géographique avec des pays touchés, l'ampleur des échanges commerciaux et des migrations, et la robustesse des systèmes de santé.
- Depuis octobre 2014, un appui technique a été fourni au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Gambie, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Niger, en République centrafricaine, au Sénégal, au Soudan du Sud et au Togo à travers des missions assurées par des équipes et une assistance technique ciblée. Les réunions techniques des groupes de travail, les visites sur le terrain, les exercices théoriques de haut niveau, et les simulations sur le terrain ont aidé à déterminer les principaux domaines à améliorer. Chaque pays dispose désormais d'un plan personnalisé pour renforcer sa préparation opérationnelle.
- Entre octobre 2014 et décembre 2015, l'OMS a déployé sur le terrain plus de 341 personnes pour travailler avec les Ministères de la santé afin de combler les lacunes ou pour intégrer des équipes multipartenaires constituées pour soutenir les efforts de préparation dans les pays prioritaires et pour aider à mettre en œuvre les plans nationaux.
- L'OMS a fourni des paquetages d'équipements de protection individuelle (EPI) contenant les stocks minimums d'équipements de protection et autre matériel nécessaires pour protéger tout le personnel assurant des fonctions essentielles prenant en charge 10 patients pendant 10 jours. Tous les pays du continent africain ont reçu des paquetages d'EPI et tous les pays ont reçu une formation à l'utilisation des EPI.
- Des stocks de réserve d'EPI sont conservés dans les Entrepôts de fournitures humanitaires des Nations Unies à Accra et à Dubaï, et seront mis à la disposition des pays en cas d'épuisement de leurs stocks.

Aide au suivi dans les pays prioritaires

- Après les premières missions d'évaluation par les équipes de renforcement de la préparation effectuées dans les pays prioritaires en 2014, une deuxième phase d'activités de renforcement de la préparation a permis d'apporter une aide à chaque pays individuellement.
- Un appui technique est fourni à la demande des ministères de la santé pour renforcer la préparation en cas d'épidémie d'Ebola en opérationnalisant les plans, en testant les systèmes, en renforçant les capacités et en offrant des conseils techniques.

Agents de préparation en cas d'épidémie d'Ebola

- Des agents de préparation en cas d'épidémie d'Ebola ont été déployés pour aider à mettre en œuvre les plans de préparation des pays, coordonner les partenaires, fournir un point focal pour la collaboration entre les institutions, fournir un appui technique spécifique dans leurs domaines d'expertise respectifs, et développer les capacités du personnel OMS national. Des agents de préparation sont actuellement déployés au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Niger, en République centrafricaine, au Sénégal et au Togo.

Formations, exercices et simulations

- Les pays prioritaires ayant mis en œuvre au minimum 50 % des activités répertoriées dans la liste de contrôle pour se préparer à faire face à Ebola sont encouragés à tester leur préparation et leur riposte à l'épidémie en réalisant une série d'entraînements et de simulations sur les diverses composantes d'une riposte à Ebola.
- Deux membres du personnel technique ont été nommés et travaillent actuellement avec les pays prioritaires pour évaluer les besoins en formation à la surveillance.
- En janvier 2016, l'OMS aidera le Ministère de la santé togolais à cartographier les risques au Togo afin de hiérarchiser les risques et d'élaborer des plans de préparation ciblés en janvier 2016.

Indicateurs de surveillance et de préparation

- Les indicateurs basés sur les données de surveillance, les capacités de prise en charge des cas, les services d'analyses en laboratoire et les stocks d'équipements sont recueillis chaque semaine auprès des quatre pays limitrophes des pays touchés : Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal.
- Un tableau de bord interactif de la préparation, élaboré à partir de la liste de contrôle OMS pour se préparer à faire face à la maladie à virus Ebola,¹ est disponible en ligne.

¹ Voir : <http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-preparedness-checklist/fr/>.

ANNEXE 1 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA PHASE 3 DE LA RIPOSTE A EBOLA

Indicateur	Cible	Numérateur	Dénominateur
OBJECTIF 1 : Interrompre toutes les chaînes de transmission			
Nombre de cas confirmés	0	Nombre de nouveaux cas confirmés	s.o.
Nombre de décès confirmés et proportion de décès survenus dans la communauté	0	Nombre total de nouveaux décès confirmés Nombre de nouveaux décès communautaires avec écouvillons positifs pour Ebola	s.o.
Pourcentage de nouveaux cas parmi les contacts recensés	100 %	Nombre de nouveaux cas confirmés recensés comme contacts	Nombre de nouveaux cas confirmés
OBJECTIF 2 : Prévenir/Les survivants			
Nombre de survivants recensés et nombre estimé de survivants	s.o. 100 %	Nombre de survivants recensés Nombre estimé de survivants	s.o.
Nombre et pourcentage de survivants recensés ayant accès à l'ensemble de services essentiels	100 %	Nombre de survivants recensés ayant accès à l'ensemble de services essentiels	Nombre de survivants recensés
Nombre d'échantillons de sperme de survivants analysés et pourcentage de résultats positifs	s.o. 0 %	Nombre d'échantillons de sperme de survivants analysés positifs pour le virus Ebola	Nombre d'échantillons de sperme de survivants analysés pour le virus Ebola
OBJECTIF 2 : Détecter/La surveillance			
Nombre d'alertes	s.o.	Nombre d'alertes	s.o.
Nombre d'échantillons analysés (prélevés chez des cas suspects vivants ou décédés)	s.o.	Nombre d'échantillons analysés pour le virus Ebola (prélevés chez des cas suspects vivants ou décédés)	s.o.
Pourcentage de préfectures/comtés/districts qui ont fourni des échantillons à tester	100 %	Nombre de préfectures/comtés/districts qui ont fourni des échantillons à tester	Nombre de préfectures/comtés/districts
OBJECTIF 2 : Riposter/Les équipes d'intervention rapide			
Nombre d'équipes d'intervention rapide opérationnelles aux niveaux national et/ou infranational	3 par pays	Nombre d'équipes d'intervention rapide nationales dotées du personnel, de l'équipement et du budget nécessaires	s.o.
Nombre d'exercices de simulation d'ampleur nationale réalisés		Nombre d'exercices de simulation d'ampleur nationale réalisés	s.o.

ANNEXE 2 : ENSEMBLE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA PHASE 3 DE LA RIPOSTE A EBOLA

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
OBJECTIF 1 : Interrompre toutes les chaînes de transmission		
Nombre de cas confirmés	Nombre de nouveaux cas confirmés	s.o.
Nombre de décès confirmés et proportion de décès survenus dans la communauté	Nombre total de nouveaux décès confirmés Nombre de nouveaux décès communautaires avec écouvillons positifs pour Ebola	s.o.
Pourcentage de nouveaux cas parmi les contacts recensés	Nombre de nouveaux cas confirmés recensés comme contacts	Nombre de nouveaux cas confirmés
Nombre d'agents de santé nouvellement infectés	Nombre d'agents de santé nouvellement infectés	s.o.
Délais (en jours) entre l'apparition des symptômes et l'isolement des cas	Délai entre l'apparition des symptômes et l'hospitalisation des cas confirmés, probables ou suspects (moyenne géométrique du nombre de jours)	s.o.
Taux de létalité	Nombre de décès parmi les cas confirmés hospitalisés	Nombre de cas confirmés hospitalisés pour lesquels les données de survie sont établies
OBJECTIF 2 : Prévenir/Les survivants		
Accord sur les services essentiels aux survivants	Accord sur les services essentiels aux survivants (oui/non)	s.o.
Accord sur les responsabilités des différentes institutions concernant les survivants, dans le cadre d'une coordination globale entre les responsables de la gestion de la crise et le Comité régional	Accord sur les responsabilités des différentes institutions concernant les survivants (oui/non)	s.o.
Nombre de survivants recensés et nombre estimé de survivants	Nombre de survivants recensés Nombre estimé de survivants	s.o.
Nombre et pourcentage de survivants recensés ayant accès à l'ensemble de services essentiels	Nombre de survivants recensés ayant accès à l'ensemble de services essentiels	Nombre de survivants recensés
Nombre de laboratoires équipés pour détecter le virus Ebola dans des échantillons de sperme	Nombre de laboratoires équipés pour détecter le virus Ebola dans des échantillons de sperme	s.o.
Services de conseil, moyens logistiques et procédures en place pour acheminer les échantillons vers un laboratoire approprié et communiquer les informations	Services de conseil, moyens logistiques et procédures en place pour acheminer les échantillons vers un laboratoire approprié et communiquer les informations (oui/non)	s.o.
Nombre d'échantillons de sperme de survivants analysés et pourcentage de résultats positifs	Nombre d'échantillons de sperme de survivants dont le résultat est positif pour le virus Ebola	Nombre d'échantillons de sperme de survivants analysés pour le virus Ebola
Nombre et emplacement des établissements de soins primaires proposant des services essentiels aux survivants	Nombre d'établissements de soins primaires proposant des services essentiels aux survivants	s.o.

RAPPORT DE SITUATION SUR LA FLAMBÉE DE MALADIE À VIRUS EBOLA

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Nombre et emplacement des établissements de soins vers lesquels orienter les survivants	Nombre d'établissements de soins vers lesquels orienter les survivants	s.o.
Mécanisme de coordination avec les partenaires WASH (eau, assainissement et hygiène) en place	Mécanisme de coordination avec les partenaires WASH (eau, assainissement et hygiène) en place (oui/non)	s.o.
OBJECTIF 2 : Détecter/La surveillance		
Nombre d'alertes	Nombre d'alertes	s.o.
Pourcentage de préfectures/comtés/districts qui notifient les alertes	Nombre de préfectures/comtés/districts qui notifient les alertes	Nombre total de préfectures/comtés/districts
Pourcentage d'alertes signalant une personne vivante testée pour le virus Ebola	Nombre d'alertes signalant une personne vivante testée pour le virus Ebola	Nombre de patients vivants recensés qui remplissent les critères pour un dépistage d'Ebola
Pourcentage de décès communautaires attendus qui ont été notifiés	Nombre de décès communautaires notifiés <i>(Sierra Leone : nombre d'alertes signalant une inhumation)</i>	Nombre de décès communautaires attendus (mortalité brute x population)
Pourcentage de décès communautaires notifiés qui ont fait l'objet d'un écouvillonnage et qui se sont révélés positifs pour le virus Ebola	Nombre de décès communautaires qui ont fait l'objet d'un écouvillonnage pour la maladie à virus Ebola <i>(Libéria et Sierra Leone : nombre d'écouvillons pour Ebola)</i> Nombre de nouveaux décès communautaires donnant des écouvillons positifs pour Ebola	Nombre de décès communautaires notifiés <i>(Sierra Leone : nombre d'alertes signalant une inhumation)</i>
Nombre d'échantillons analysés (issus de cas suspects vivants ou décédés)	Nombre d'échantillons analysés pour le virus Ebola (issus de cas suspects vivants ou décédés)	s.o.
Pourcentage de préfectures/comtés/districts fournissant des échantillons pour le dépistage d'Ebola	Nombre de préfectures/comtés/districts fournissant des échantillons pour le dépistage d'Ebola	Nombre total de préfectures/comtés/districts
Nombre d'inhumations à risque	Nombre d'inhumations signalées comme à risque	s.o.
Nombre de préfectures/comtés/districts ayant connu au moins un incident lié à la sécurité ou une autre forme de refus de coopérer	Nombre de préfectures/comtés/districts ayant connu au moins un incident lié à la sécurité ou une autre forme de refus de coopérer au cours de la semaine précédente	s.o.
OBJECTIF 2 : Riposter/Les équipes d'intervention rapide		
Nombre d'équipes d'intervention rapide opérationnelles aux niveaux national et/ou infranational	Nombre d'équipes d'intervention rapide au niveau national et/ou infranational dotées du personnel, de l'équipement et du budget nécessaires	s.o.
Délai entre la confirmation d'un événement et le déploiement d'une équipe d'intervention rapide	Nombre de jours entre la confirmation d'un événement et le déploiement de l'équipe	s.o.

RAPPORT DE SITUATION SUR LA FLAMBÉE DE MALADIE À VIRUS EBOLA

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Nombre de cas générés et de cas secondaires après l'identification d'un nouveau cas indicateur	Nombre de cas générés et de cas secondaires après l'identification d'un nouveau cas indicateur	s.o.
Nombre et pourcentage de préfectures/comtés/districts dotés de capacités d'isolement ou d'un plan pour l'orientation des cas suspects	Nombre de préfectures/comtés/districts dotés de capacités d'isolement ou d'un plan pour l'orientation des cas suspects	Nombre total de préfectures/comtés/districts
Nombre d'exercices de simulation d'ampleur nationale réalisés	Nombre d'exercices de simulation d'ampleur nationale réalisés	s.o.
Nombre d'équipes internationales d'aide à l'intervention rapide opérationnelles en attente	Nombre d'équipes internationales d'aide à l'intervention rapide en attente qui sont dotées du personnel, de l'équipement et du budget nécessaires	s.o.
Délai entre la demande d'intervention internationale et le déploiement des équipes internationales d'aide à l'intervention rapide	Nombre de jours entre la demande d'intervention internationale et le déploiement des équipes internationales d'aide à l'intervention rapide	s.o.
Nombre d'exercices de simulation d'ampleur internationale réalisés	Nombre d'exercices de simulation d'ampleur internationale réalisés	s.o.