



- L'urgence de santé publique de portée internationale liée à Ebola en Afrique de l'Ouest a été déclarée terminée le 29 mars 2016. Au total, 28 616 cas confirmés, probables et suspects ont été notifiés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, dont 11 310 décès.
- Dans le dernier foyer en date, sept cas confirmés et trois cas probables de maladie à virus Ebola ont été notifiés entre le 17 mars et le 6 avril par les préfectures de N'Zérékoré (neuf cas) et Macenta (un cas) dans le sud-est de la Guinée. La femme et les deux enfants du cas de Macenta, qui se sont rendus à Monrovia (Libéria), ont été confirmés positifs à Ebola entre le 1^{er} et le 5 avril.
- Le cas indicateur de ce foyer (une femme âgée de 37 ans provenant de Koropara, une sous-préfecture de N'Zérékoré) a vu ses symptômes apparaître aux environs du 15 février et est décédé le 27 février sans diagnostic confirmé. La source de son affection est probablement due à une exposition à des liquides biologiques infectés d'un survivant d'Ebola.
- En Guinée, le dernier cas enregistré a obtenu un deuxième résultat négatif au test de dépistage d'Ebola le 19 avril. Au Libéria, le dernier cas a obtenu un deuxième résultat négatif le 28 avril.
- Un délai de 42 jours (deux fois la période d'incubation) doit s'écouler avant de pouvoir déclarer la fin de la flambée épidémique en Guinée et au Libéria. En Guinée, ce délai se sera écoulé le 31 mai et au Libéria, le 9 juin.
- La Sierra Leone a contenu la dernière flambée d'Ebola en mars 2016 ; elle maintient une surveillance soutenue avec l'obligation de réaliser des écouvillonnages et de tester tous les décès signalés, et de procéder sans délai à l'investigation et au dépistage de tous les cas suspects. La politique d'écouvillonnage sera revue le 30 juin.

Évaluation des risques

Une surveillance active se poursuit en Guinée et au Libéria et continuera pendant 42 jours après le résultat négatif au test de dépistage d'Ebola du dernier cas enregistré. Les indicateurs de performance suggèrent que la capacité de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone à prévenir (programme pour les survivants d'Ebola), à détecter (surveillance épidémiologique et analyses de laboratoire) et à riposter à de nouvelles flambées épidémiques reste variable (Tableau 1). Le risque de nouvelles flambées épidémiques dues à l'exposition à des liquides biologiques infectés de survivants d'Ebola persiste et requiert des efforts soutenus pour le réduire, à travers des activités de conseil en matière de pratiques sexuelles protégées et d'analyses de liquides biologiques.

Tableau 1. Principaux indicateurs de performance pour la gestion des risques résiduels en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone au cours des trois semaines précédant le 8 mai 2016

Indicateur	Guinée	Libéria	Sierra Leone
Objectif 2 : Prévenir/Les survivants			
Nombre de survivants recensés (bleu foncé) et nombre estimé de survivants (bleu clair)			
Nombre et pourcentage de survivants recensés qui ont eu accès aux services#			
Nombre d'échantillons de sperme de survivants testés (bleu clair) et nombre cumulés de résultats initialement positifs (bleu foncé)			Données non disponibles
Objectif 2 : Détecter/La surveillance			
Nombre d'alertes (personnes vivantes en bleu clair, décès communautaires en bleu foncé)			
Nombre d'échantillons# nouveaux et répétés testés (personnes vivantes en bleu clair, personnes décédées en bleu foncé)			
Pourcentage de préfectures/comtés/districts qui ont fourni des échantillons à tester			
Objectif 2 : Riposter/Les équipes d'intervention rapide			
Nombre d'équipes d'intervention rapide nationales et/ou infranationales opérationnelles	Données non disponibles		
Nombre d'exercices de simulation d'ampleur nationale réalisés			

Toutes les données sont fournies par les bureaux de pays de l'OMS. La définition des principaux indicateurs de performance peut être consultée à l'annexe 1 des précédents rapports de situation sur Ebola.¹
 ** Le nombre estimé de survivants n'est pas encore confirmé. # Les services au Libéria comprennent actuellement le dépistage sur échantillons de sperme et le conseil pour les hommes ayant survécu à Ebola, tandis qu'en Sierra Leone, les services font actuellement référence aux soins oculaires pour les survivants. * Données correspondant à une période de trois semaines se terminant le 20 décembre 2015.

¹ <http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports>.